



Réseau d'Observation Mancelle
de la Pathologie Infectieuse

*Docteur, je tousse... je mouche...
... J'ai mal à la gorge !*

*Jamais depuis le début du ROMPI, l'activité des médecins n'aura été aussi calme que la semaine dernière. La grippe a totalement disparu, ainsi que les gastro-entérites. Cependant, les cas d'infections respiratoires aiguës observés sont volontiers d'origine bactérienne : pneumonies atypiques à mycoplasme (elles n'ont rien à voir avec le SRAS chinois), sinusites, angines. De ce fait, les antibiotiques sont **PARFOIS UTILES**.*

Ce que vos patients vont lire dans le Maine Libre demain, Jeudi

Quelles précautions contre les infections pendant la grossesse ?

A la sortie de l'adolescence, nous sommes immunisés naturellement contre la plupart des "infections infantiles". Dans un petit nombre de cas, cependant l'immunité acquise est trop faible ou, même, n'existe pas. Pour les femmes, ces infections d'habitude bénignes et qui le plus souvent passent inaperçues peuvent par contre en cas de grossesse, s'avérer dangereuses pour le bébé qu'elles portent.

C'est le cas, par exemple, de la toxoplasmose. Cette maladie bénigne est transmise aux humains soit par le contact des chats, soit par la consommation de viande insuffisamment cuite ou de crudités mal lavées. Arrivées à l'âge de la première grossesse, environ un tiers des femmes n'est pas immunisé contre cette maladie qui peut entraîner lorsqu'elle est contractée pendant la grossesse un avortement spontané ou l'apparition de malformations graves. Pour éviter un drame, il est important de prendre un certain nombre de précautions très simples :

- faire en début de grossesse la prise de sang (obligatoire) pour savoir si on est immunisé ou non
- si le résultat est positif, il signifie qu'on est immunisé contre la toxoplasmose. Tout va bien, aucune précaution particulière n'est nécessaire.
- si le test est négatif, il signifie qu'on n'est pas protégé contre la toxoplasmose et qu'il faut faire très attention : refaire le test tous les mois pour détecter immédiatement une éventuelle infection et recevoir les traitements adéquats (si la toxoplasmose est traitée à temps par antibiotiques, la catastrophe pourra être évitée). Il faut aussi éviter soigneusement tout ce qui peut vous transmettre la toxoplasmose.


Précautions à prendre :

- bien cuire les viandes qu'on consomme
- éviter le contact des chats et tout ce qui peut être contaminé par leurs excréments
- éplucher et rincer soigneusement les fruits, les légumes et les herbes aromatiques
- mettre des gants pour jardiner
- se laver soigneusement et fréquemment les mains, notamment avant de passer à table.

Par contre, une fois votre grossesse terminée n'ayez plus peur des chats au contraire, fréquentez les assidûment vous attraperez peut-être ainsi la toxoplasmose et vous serez protégé définitivement pour les prochaines grossesses.

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine de ville.


Comparaison CUM—France métropolitaine. Sources: ROMPI, GROG France



Infections respiratoires à l'affiche cette semaine
Virus parainfluenza 3
Mycoplasmes pulmonaires

Signalés par les médecins du ROMPI

- sinusites, angines, otites,
- Pharyngites,
- Allergies, varicelles, zonas



Niveau d'activité médicale

% participation en vacances	100 % des médecins
Jours travaillés	0% des médecins
Actes	4,4 par semaine
Visites	23,8 par jour
	10 % des actes

IRA	8% des actes
IRA	8 /médecin/semaine
0-4 ans	23 %
5-14 ans	20 %
15-64 ans	50 %
65 ans et +	7 %
BD	0 /médecin/semaine

Antibios dans	36 % des IRA
AT courts	4% des actes
AT courts	4,2 /médecin/semaine

Contacts

ROMPI: coordination **02.43.39.97.93** GROG Marion QUESNE **01.56.55.51.51** Mél: rompi@openrome.org Web: www.grog.org