



Réseau d'Observation Mancelle  
de la Pathologie Infectieuse

**Docteur, je tousse... je mouche...  
... J'ai mal à la gorge !**

*Très peu d'infections virales. L'épidémie de varicelle épargne toujours la CUM. Les médecins du ROMPI ne signalent que quelques angines et quelques sinusites. Les antibiotiques sont RAREMENT UTILES.*

*Ce que vos patients vont lire dans le Maine Libre demain, Jeudi*

**Nos amies les bêtes ont la dent dure**

*Les chiens et les chats, toujours plus nombreux dans notre pays, ne sont pas toujours des animaux de « bonne » compagnie et de très nombreux cas de morsures sont recensés chaque année en France.*

**Les enfants surtout**

Plus de la moitié des cas concernent des enfants, plus souvent des garçons. Si la majorité des morsures est bénigne, certaines d'entre elles peuvent avoir des conséquences très graves. Le schéma « jeune enfant – gros chien » est alors souvent la règle : les petits sont mordus au visage avec un risque important de séquelles esthétiques ; une consultation aux urgences chirurgicales s'impose alors immédiatement.

**Un risque infectieux non négligeable**

On entend souvent vanter les vertus « antiseptiques » du léchage par les chiens ! Pourtant, une morsure de chien ou de chat est toujours porteuse de microbes et doit être désinfectée. Seules les toutes petites plaies peuvent être soignées à la maison à condition d'être lavées énergiquement à l'eau et au savon, puis nettoyées avec un antiseptique. Les morsures plus importantes doivent être rapidement montrées au médecin. Un nettoyage adapté et mené dans les 6 premières heures limite de manière efficace le risque d'infection. Un traitement antibiotique n'est alors généralement pas indiqué.

Sauf lorsqu'il s'agit du visage, il est habituel de ne pas suturer la plaie ou d'attendre quelques jours pour le faire.

Quelle que soit sa taille, la plaie doit être surveillée de près dans les jours qui suivent la morsure et une consultation s'impose au moindre doute d'infection. Votre médecin pourra alors vous prescrire les antibiotiques adaptés.

Deux autres risques doivent toujours être évalués :

- la rage : le chien est-il correctement vacciné ?
- le tétanos : la vaccination du patient est-elle à jour ?


**En pratique, devant une morsure de chien ou de chat**

- . Désinfectez vigoureusement les petites plaies superficielles et surveillez leur évolution.
- . En cas de doute (vaccination antitétanique non à jour, taille, profondeur ou aspect de la plaie, crainte de séquelles esthétiques...), n'hésitez pas à consulter sans attendre votre médecin.
- . Apportez à toute consultation le carnet de vaccination du blessé.
- . Toute morsure importante ou profonde relève de soins chirurgicaux en urgence.
- . N'oubliez surtout pas de noter les coordonnées du chien et de son maître. Ces éléments sont indispensables pour contrôler la vaccination antirabique de l'animal ou pour engager des démarches juridiques. Si le chien est errant, la vaccination du blessé contre la rage est souvent conseillée.
- . Enfin, apprenez très tôt à vos enfants savoir côtoyer prudemment les animaux.

**Infections respiratoires  
à l'affiche cet  
RAS**

**Signalés par les médecins du  
ROMPI**

- Angines, sinusites,
- 1 pneumopathie,
- 1 herpès génital,
- 1 otite externe.



**Grippe aviaire  
en Asie du Sud-Est**

**Conseils aux voyageurs**

La grippe aviaire sévit à nouveau dans des élevages de volailles au Vietnam, en Chine et en Thaïlande. La Direction Générale de la Santé rappelle aux personnes voyageant dans ces pays d'éviter tout contact avec les volailles et les oiseaux (élevages, fermes, marchés...).


*Pour en savoir plus :*  
<http://www.sante.gouv.fr>

**Niveau d'activité médicale**

% participation en vacances	90 % des médecins
Jours travaillés	3,4 par semaine
Actes	25,5 par jour
Visites	8 % des actes
IRA	6 % des actes
IRA	5/médecin/semaine
0-4 ans	34 %
5-14 ans	13 %
15-64 ans	44 %
65 ans et +	9 %
BD	0,1/médecin/semaine
Antibios dans AT courts	30 % des IRA
AT courts	3 % des actes
AT courts	2,8 médecin/semaine

**Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine de ville.**

Comparaison CUM—France métropolitaine. Sources: ROMPI, GROG France



**Contacts**

ROMPI: coordination **02.43.39.97.93** GROG Marion QUESNE **01.56.55.51.51** Mél: [rompi@openrome.org](mailto:rompi@openrome.org) Web: [www.grog.org](http://www.grog.org)