



Données épidémiologiques sur les noyades accidentelles en France.

Les noyades constituent un important problème de santé publique en France, responsable chaque année de plus de 500 décès, ou de séquelles parfois lourdes lorsqu'elles ne sont pas suivies de décès. Une meilleure connaissance épidémiologique des caractéristiques des victimes et des circonstances des accidents permettrait d'éviter certaines noyades. L'institut de veille sanitaire (InVS), la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur ont mis en place l'enquête Noyades 2002.¹ Nous en apportons les principaux résultats.

Noyades 2002 était une enquête transversale, qui avait pour objectif de recenser le nombre des noyés suivant le lieu, de décrire le devenir des victimes et leur devenir, de renseigner sur les conditions de survenue, la gravité et les circonstances de la noyade. Elle a eu lieu du 1 juin au 30 septembre 2002. Toute personne victime d'une noyade ayant nécessité l'intervention des secours organisés devait être incluse. 2826 noyades accidentelles ont été recensées, avec 252 décès (8,9%). 49% des victimes avaient de 6 à 24 ans, 67% étaient de sexe masculin, 6% avaient plus de 65 ans (avec 19% des décès).

Noyades en piscine privée (familiale ou à usage collectif – hôtel, camping, club vacances): 121 personnes ont été victimes (64 de moins de 6 ans), 92 ont été hospitalisées, 25 sont décédées (14 de moins de 6 ans). Les départements du sud-est sont les plus touchés. Les circonstances de survenue étaient: défaut de surveillance (38%), chute (23%), ne pas savoir nager (14%).

Noyades en piscine publique ou privée d'accès payant!: 53 personnes ont été victimes, 43 ont été hospitalisées (80%) et 11 sont décédées (21%). Parmi les victimes, 28 (68%) avaient moins de 20 ans, dont 13 de 6 à 12 ans et 10 de 13 à 19 ans. Les départements les plus touchés sont la Haute-Savoie, la Seine St Denis, et le Pas-de-Calais. Les